

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

## AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pallasier

63034 Clermont Ferrand Cedex

☎ (73) 92-42-68



BULLETIN TECHNIQUE  
PUBLICATION PERIODIQUE

### Edition générale

### N°25

Le 26 Août 1983

## VIGNE

### POURRITURE GRISE

Le stade début véraison est atteint en tous secteurs.

Après la sécheresse du mois de Juillet, les pluies récentes ont provoqué l'éclatement de grains et l'installation de cette maladie.

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à son développement à partir de ces grains ou de ceux atteints par les vers de la grappe.

*Il y a lieu d'effectuer rapidement un traitement avec une spécialité à base d'imides cycliques : ROVRAL, KIDAN, RONILAN, SUMISCLEX.*

Soigner l'application : pulvérisation dirigée sur les grappes.

### BLACK-ROT

Allier

*Poursuivre la protection dans les vignes atteintes avec des produits à base de Mancozèbe, Manèbe, Propinèbe à 280 g de Matière Active par hl d'eau.*

### CICADELLE

Les attaques de ce ravageur sont très faibles.

Le seuil d'intervention est de une larve en moyenne par feuille. (comptage effectué sur une cinquantaine de feuilles, face inférieure).

*Dans la plupart des situations, un traitement spécifique n'est pas justifié.*

DIRECTEUR-GERANT: B. MORIN

N° de série: 328

Numéro d'inscription à la C.P.P.A.P.: 525 AD

Régie de Recettes de la D.D.A. C.C.P. Clermont-Ferrand 5 503.17

ABONNEMENT ANNUEL: 100 F

P.217.4

## ARBRES FRUITIERS

### POU DE SAN JOSE

Les premières larves de deuxième génération ont été observées.


*Un traitement doit être appliqué à partir du 30 Août sur toutes les espèces sensibles.*

Utiliser un produit à base de Méthidathion, Oléoparathion ou Parathion.

Renouveler l'application 15 jours après le 1er traitement afin de couvrir la période d'apparition des larves.

### MINEUSES

De fortes attaques de mineuse cerclée sont visibles dans les régions de VEYRE-MONTON et CHARBONNIER-LES-MINES (63).



2 à 4 générations se succèdent au cours de la saison.

Si le premier vol est bien individualisé, les vols suivants sont plus ou moins échelonnés et peuvent se chevaucher.

Aucun traitement n'est efficace lorsque les mines sont développées.

Celui-ci doit intervenir dès le début des pontes avec un produit à base de diflubenzuron (DIMILIN) ou à l'éclosion des oeufs avec un produit à base de Méthomyl (LANNATE 20 L) ou Méthidathion (ULTRACIDE).

### MINEUSE CERCLEE

*Leucoptera  
scitella*

Une intervention n'est justifiée que si l'on compte plus d'une mine par feuille.

Si aucun traitement spécifique n'a encore été réalisé, une intervention peut être effectuée actuellement dans les vergers atteints.